




# Decapeptyl® L.P.

## PIERRE ANGULAIRE du traitement du cancer de la prostate<sup>1-3</sup>

### ● 3 stades du cancer de la prostate<sup>1-3</sup>



L'indication dans le traitement du cancer de la prostate localisé à haut risque en association à la radiothérapie est non remboursable et non agréée aux collectivités à la date du 18 décembre 2020.

### ● 3 formulations pour s'adapter aux besoins de vos patients<sup>1-3</sup>



### ● 3 décennies d'expertise en suppression androgénique

Decapeptyl® L.P. 3 mg<sup>1</sup> et Decapeptyl® L.P. 11,25 mg<sup>2</sup> sont indiqués dans le :

- traitement du cancer de la prostate localisé à haut risque ou localement avancé, en association à la radiothérapie (voir Propriétés pharmacodynamiques).

- traitement du cancer de la prostate localement avancé ou métastatique.

Un effet favorable du médicament est d'autant plus net et plus fréquent que le patient n'a pas reçu auparavant un autre traitement hormonal.

Médicament soumis à prescription médicale. Liste I. Remb. Séc. 65 % Ag. Coll.

L'indication dans le traitement du cancer de la prostate localisé à haut risque en association à la radiothérapie est non remboursable et non agréée aux collectivités à la date du 18 décembre 2020.

Decapeptyl® L.P. 22,5 mg<sup>3</sup> est indiqué dans le :

- traitement du cancer de la prostate hormono-dépendant localisé à haut risque ou localement avancé, en association à la radiothérapie (voir Propriétés pharmacodynamiques).

- traitement du cancer de la prostate hormono-dépendant localement avancé ou métastatique.

Médicament soumis à prescription médicale. Liste I. Remb. Séc. 100 % Ag. Coll.

L'indication dans le traitement du cancer de la prostate localisé à haut risque en association à la radiothérapie est non remboursable et non agréée aux collectivités à la date du 18 décembre 2020.

**Decapeptyl® L.P. 3 mg<sup>1</sup>**

- Poudre et solvant pour suspension injectable (IM) forme à libération prolongée sur 28 jours.

- Boîte de 1 flacon de poudre, 1 ampoule de solvant et 1 seringue et 2 aiguilles.

- Médicament autorisé n°34009 339 437 6 9.

**Decapeptyl® L.P. 11,25 mg<sup>2</sup>**

- Poudre et solvant pour suspension injectable (IM ou SC) forme à libération prolongée sur 3 mois.

- Boîte de 1 flacon de poudre et 1 ampoule de solvant avec 1 seringue et 3 aiguilles.

- Médicament autorisé n°34009 341 256 5 2.

**Decapeptyl® L.P. 22,5 mg<sup>3</sup>**

- Poudre et solvant pour suspension injectable (IM) forme à libération prolongée sur 6 mois.

- Boîte de 1 flacon de poudre, 1 ampoule de solvant stérile et 1 blister contenant une seringue et deux aiguilles.

- Médicament autorisé n°34009 398 901 7 3.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit et les avis de la Commission de la transparence sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>



\* L'hormonothérapie en monothérapie est à proposer en dernier recours, chez les patients non éligibles à la radiothérapie avec des comorbidités sévères<sup>5</sup>

1. Résumé des Caractéristiques du Produit Decapeptyl® L.P. 3 mg.

2. Résumé des Caractéristiques du Produit Decapeptyl® L.P. 11,25 mg.

3. Résumé des Caractéristiques du Produit Decapeptyl® L.P. 22,5 mg.

4. Avis de la Commission de la Transparence de Decapeptyl® L.P. 25 juillet 2018.

5. Rozet F et al. Recommandations françaises du Comité de Cancérologie de l'AFU - Actualisation 2018-2020 : cancer de la prostate. Prog Urol 2018;28:79-130.